

Tabel 3. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2021 - Korrelmaïs en corn cob mix

 Gemiddelde resultaten over de jaren 2015 t/m 2020 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Snelheid grondbedekking	Vroegheid bloei	Helminthosporium tolerantie	Oogstbaarheid ³⁾	Stengelrot resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Plantlengte	Korrel			Aantal jaren in onderzoek ⁶⁾
										Vochtgehalte ⁴⁾	Drogestof gehalte	Drogestof opbrengst ⁵⁾	
AANBEVOLEN RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix													
	KWS Stabil	7	7	*	6,5	6	6,5	7,5	108	23,4	104	95	6
N	KWS PRIXDOR	8	8	*	7,5	7,5	7,5	*	94	24,4	103	96	4
N	KWS Magnet	9	7	*	7,5	7,5	7,5	*	97	24,9	102	95	4
	Benedictio KWS	8,5	7	*	7,5	7	7,5	8	103	26,3	100	97	6
	AgroFides	8	7,5	*	7,5	7,5	7,5	*	99	26,4	100	100	5
N	KWS Osiris	8	7,5	*	7	6,5	7	*	103	26,4	100	99	4
	ES Hubble	7,5	7,5	*	8,5	8,5	7,5	*	108	26,8	99	97	5
	Megusto KWS	7,5	9	*	7	6,5	7,5	7	97	26,9	99	103	6
	LG 31.211	7,5	8,5	*	7	6,5	7,5	8,5	95	27,0	99	98	6
	Ricardinio	8	7	7	7	7	8	8	105	27,0	99	98	6
	Genialis KWS	8	7,5	7,5	8	8	8	8	95	27,1	99	100	6
	Kompetens	7	8,5	8	7,5	7,5	8	8	94	27,2	99	100	6
N	LG 31.219	7	8	*	7,5	7,5	7,5	*	104	27,6	98	102	3
	ES Crossman	7	7	7	7	7,5	7	7,5	107	27,7	98	97	6
N	LG 31.225	7,5	8	*	7,5	7,5	7,5	*	98	27,8	98	103	4
N	KWS Corazon	8	7,5	*	8	8	8	*	103	27,9	98	103	4
	Millesim	7,5	8	7	8	7,5	8	7,5	97	28,0	98	97	6
N	KWS Gustavius	7	6	*	8,5	8	8	*	97	29,5	96	102	3
100=...resp. in cm, %, ton/ha									314		73,7	10,8	

- 1) Plantlengte, drogestofgehalte en drogestofopbrengst zijn weergegeven in verhoudingsgetallen
 - 2) Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid. N - Nieuw Aanbevolen, rassen die voor 1e of 2e jaar op de lijst staan.
 - 3) Oogstbaarheid duidt op de kans op omgevallen planten door zowel een stengelrotaantasting als door gebrek aan stevigheid. Beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk aangegeven.
 - 4) Vochtgehalte is 100 - drogestofgehalte (absoluut). Laag vochtgehalte betekent lagere droogkosten en is dus gunstig voor korrelmaïs
 - 5) 100 = 13.4 ton/ha bij 16% vocht (korrelmaïs) en 17.3 ton/ha bij 35% vocht (corn cob mix) - proefveldopbrengsten
 - 6) Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar.