

Persbericht

Zoetermeer, 21 oktober 2025

Nieuwe aanbevolen rassen voor voedergrassen

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft besloten om zes nieuwe rassen van Engels raaigras, voedertype, op te nemen op de Aanbevelende Rassenlijst 2026.

De rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – diploïde rassen

Grazeon	kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen Vertegenwoordiger: DSV zaden Nederland B.V., Gennep
Scartorp	kweker: DLF A/S, Roskilde (DK) vertegenwoordiger: DLF B.V., Kapelle

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – tetraploïde rassen

Evention	kweker: ILVO – Plant, Melle (B) vertegenwoordiger: DSV zaden Nederland B.V., Gennep
Barbrisk	kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen
Meltrio	kweker: ILVO – Plant, Melle (B) vertegenwoordiger: Vandinter Semo B.V., Scheemda

Engels raaigras – laat doorschietend (weidetype) – tetraploïde rassen

Champus	kweker: DSV zaden Nederland B.V., Gennep
----------------	--

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81 33 56 33

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding “CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026”.

Tabel 1. Engels raaigras - middentijds doorschietend diploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering	Rasnaam 1)	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
N	Diploïde rassen								
	Bartui	20-5	8,1		8,3	106	103	103	104
	Barriot	21-5	7,7	7,1	8,1	108	86	100	97
	Barmazing	21-5	8,0	7,4	8,6	104	100	104	104
	Armetto	22-5	8,1	6,0	7,9	102	97	98	97
	Arsenal	22-5	8,0	7,1	7,0	100	93	95	95
	Arelia	22-5	8,0	7,4	7,4	98	98	99	99
	Barcrement	23-5	8,2	6,7	7,6	98	101	97	100
	Meltruck	23-5	8,7		7,9	96	99	100	98
	Probus	24-5	8,0		7,4	104	102	102	100
	Grazeon	24-5	8,3		8,0	96	106	99	103
	Melspring	25-5	8,2	6,9	7,2	102	94	97	96
	Barround	25-5	8,3	7,1	8,6	97	107	101	103
	Maqui	25-5	8,2	7,3	8,0	92	100	96	96
	Sputnik	26-5	8,1	6,6	8,2	100	103	102	100
	Norwich	26-5	8,0		7,6	99	104	102	102
	Barlevel	27-5	8,3		8,3	102	102	98	99
	Novix	28-5	8,4		8,8	94	95	96	98
	Abosan 1	28-5	8,2	6,8	7,6	89	101	96	94
	Armando	29-5	8,4	7,5	7,6	90	103	98	99
N	Scartorp	30-5	8,1		8,3	93	112	98	97
100 = ton ds/ha						3,6	2,6	12,8	11,3

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Tabel 2. Engels raaigras - laat doorschietend - diploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidsproefvelden
	Diploïde rassen								
N	Barpendel	31-5	8,3		8,3	109	99	103	104
N	Maidstone	31-5	8,3		8,6	105	97	94	100
	Maiko	1-6	8,4	7,4	7,7	98	100	99	101
	Barathon	2-6	8,5		8,0	108	98	102	103
N	Fabrizio	2-6	8,4		8,1	105	100	99	98
	Swan	2-6	8,4	7,5	8,2	102	97	101	101
	Barbitol	2-6	8,3	6,9	8,2	97	105	101	101
	Manchester	2-6	8,2	7,4	8,1	94	101	99	98
	Melonora	2-6	8,5	7,0	7,9	94	102	100	98
	Barspring	3-6	8,0	7,3	7,1	94	103	100	96
N	Molner	4-6	8,1		8,6	94	101	101	101
	Barhoney	5-6	8,3	7,2	7,7	100	96	100	100
	Rossimonte	6-6	8,2	6,8	7,8	99	100	102	99
	100 = ton ds/ha					2,9	2,9	12,4	10,9

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Tabel 3. Engels raaigras - middentijds doorschietend – tetraploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
N	Tetraploïde rassen								
	Astrian	19-5	7,7		8,5	115	89	100	102
	Explosion	22-5	8,0	7,3	8,1	104	88	94	97
	Baranova	23-5	7,7	7,4	8,3	108	95	101	100
	Velonit	24-5	7,9	7,8	8,0	103	94	96	98
	Memisa	24-5	8,2	7,5	8,4	102	95	98	97
	Wappo	25-5	8,3	7,5	8,1	97	102	99	101
	Barojet	26-5	8,2	7,6	7,7	96	108	100	99
	Melforce	27-5	8,2	7,9	8,2	99	101	101	103
	Barleffe	27-5	7,8	7,4	8,6	98	100	97	98
N	Mons	28-5	7,9		8,6	98	104	103	103
	Barrialto	28-5	7,9		9,0	97	104	102	100
	Melville	28-5	8,3	7,4	8,7	92	101	97	100
	Weldone	28-5	8,2	7,7	8,1	92	105	96	98
	Briant	29-5	8,0	7,5	8,1	100	101	99	99
N	Evention	29-5	8,2		8,3	94	100	100	99
N	Barbrisk	29-5	8,3		9,0	94	103	101	96
N	Meltio	30-5	8,6		8,8	101	108	107	105
	Barclima	30-5	8,3	7,3	7,9	96	101	101	96
	100 = ton ds/ha					3,6	2,7	13,1	11,3

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Tabel 4. Engels raaigras - laat doorschietend - tetraploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
N	Tetraploïde rassen								
	Mercule	31-5	8,3	7,9	8,3	102	98	103	102
	Salvina	31-5	8,3	7,7	8,1	102	98	99	99
	Melsago	31-5	8,2	7,5	8,0	99	102	100	101
	Barganza	1-6	7,9	8,0	7,0	103	101	100	100
	Neuville	1-6	8,0	7,7	8,2	100	102	100	99
	Champus	1-6	8,3		8,6	99	101	100	100
	Thegn	1-6	8,1	7,9	8,1	98	102	99	100
	Melfix	2-6	8,3	7,4	7,8	97	97	99	100
	Melkana	2-6	8,4	7,4	7,9	95	105	99	99
	Dromara	2-6	8,3	7,6	8,3	93	101	98	96
	Beau	3-6	8,2	7,8	8,2	97	103	101	100
	Melbolt	3-6	8,2	7,1	7,5	95	99	97	100
	100 = ton ds/ha					3,2	2,8	12,9	10,9

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.