

Snijmaïs, zeer vroege en vroege rassen																
Rassen	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Maiskopbrand tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte *	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek
Impression	8,5	8,5	7,5	8	0	7	98	7,5	39,1	102	101	101	101	102	103	3
Concierto	7	8,5	6	8,5	0	8	105	7,5	38,5	101	100	98	98	100	97	3
LG 31.210	7	7	7	8	0	7	104	7	38,1	100	99	98	100	101	101	3
100 = resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha *100=312							312			38,2	398	381	1007	22,3	22,6	

Snijmaïs, middenvroeg en middenlate rassen																
Rassen	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Maiskopbrand tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte *	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte gehele plant in %	Zetmeelgehalte bij oogst	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek
LG 31.251	7	7,5	8	7,5	0	9	101	7	38,3	105	96	95	101	101	102	3
100 = resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha * 100=320							320		36,6	36,6	383	374	992	23,4	23,2	